

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

MÍLDIO

A previsão meteorológica aponta para alguma instabilidade até sábado.

Assim, as vinhas que se encontrarem desprotegidas contra o míldio devem ser tratadas após este período de instabilidade. Aconselhamos um **fungicida sistémico ou penetrante, conforme a fenologia**.

As vinhas que foram oportunamente tratadas e em que não há manchas de míldio, não necessitam, para já, de novo tratamento.

Se à data da realização do tratamento anti-oidio aconselhado nesta Circular, houver previsão de chuva para os dias seguintes, deverá ser adicionado à calda um fungicida anti-míldio.

TRAÇA DA UVA

Teve já início o voo que irá originar a segunda geração da praga, mas é **ainda cedo** para efetuar qualquer tratamento. Nesta fase, os Srs. Viticultores deverão efetuar a **monitorização da praga** nas várias parcelas de vinha através de armadilhas com atrativos sexuais e deverá efetuar a **Estimativa do Risco**, contando o número de ovos e/ou perfurações existentes em 100 cachos (dois cachos ao acaso em 50 cepas).

Nota

Para **contrariar o desenvolvimento das doenças** e aumentar a eficácia dos tratamentos é muito importante que a despampa esteja realizada e que a vegetação seja corretamente orientada. Estas operações culturais promovem o **arejamento** do interior da sebe e **facilitam** a penetração da calda fungicida.

OÍDIO

As condições ambientais têm sido favoráveis ao desenvolvimento da doença. Temos observado já manchas de oídio no cacho. Verificamos que a doença se tem manifestado principalmente nas vinhas que apresentam um grande desenvolvimento vegetativo (vigor) e em castas mais sensíveis à doença.

As vinhas devem ser **protegidas preventivamente até ao fecho do cacho / início do pintor**, realizando-se os tratamentos de acordo com a persistência de ação dos fungicidas utilizados, tendo o cuidado de **alternar as famílias químicas** dos produtos fitofarmacêuticos e **não ultrapassando o número de aplicações permitidas por ano**.

Não devem ser descuradas as operações culturais, por forma a que as sebes de vegetação permitam o arejamento da zona dos cachos e a boa penetração da calda fungicida.

PODRIDÃO NEGRA (Black Rot)

Nas vinhas onde existam manchas da doença, na escolha do fungicida deverá ter o cuidado de selecionar os fungicidas anti-oidio ou anti-míldio que possuam também eficácia contra o Black Rot.

Os fungicidas homologados para a cultura da Vinha, devem ser consultados no site da DGAV: **SIFITO-Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos**