

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

VINHA

MÍLDIO/OÍDIO

As condições meteorológicas verificadas nos últimos dias, criaram condições muito favoráveis a ocorrência de novas e sucessivas infecções de míldio e, especialmente nas vinhas mal arejadas e grande vigor, de oídio.

Aconselhamos por isso, os Sr. Agricultores, a fazerem um tratamento contra estas doenças com um produto sistémico que as combata em simultâneo.

BATATEIRA

Míldio

O estado do tempo também tem decorrido favorável ao aparecimento de infecções de míldio, pelo que, deve continuar a proteger o seu batatal, com um produto sistémico homologado para esse fim.

Nota: Os fungicidas homologados para estas culturas e finalidades, devem ser consultados no sitio da internet da DGAV:

<https://sifito.dgav.pt>

CASTANHEIRO

PODA

Cancro americano

Para evitar de fazer cortes de pernadas mais grossas e a conseqüente abertura de grandes lesões de difícil cicatrização, efectue nesta altura a poda de ramos de pequeno diâmetro, pois a cicatrização é mais facilitada e reduz as possibilidades de infecção do castanheiro por este fungo.

Os cortes devem ser executados correctamente, tendo o cuidado de, não deixando tocos que dificilmente fecharão, não cortar muito rente ao tronco.

Se for detectado cancro num ramo fino, corte de imediato, pelo menos, 20 cm abaixo da zona das lesões.

Se o cancro aparecer no tronco ou ramo grosso, retire muito bem a casca fendilhada e toda a zona infectada até atingir o tecido são. Retire do souto e queime todas as partes da planta infectadas com o cancro (casca e ramos finos ou grossos).

Os cortes deverão ser protegidos com uma pasta cicatrizante à base de cobre e o material de corte desinfectado com lixívia, antes e após cada utilização (pode ser usada lixívia diluída em água, em partes iguais).