



# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

### OÍDIO

As condições ambientais têm sido muito favoráveis ao desenvolvimento da doença, verificando-se já ataques em muitas vinhas.

Verificamos que a doença se tem manifestado principalmente nas vinhas que apresentam um grande desenvolvimento vegetativo (vigor) e em castas mais sensíveis à doença.

As vinhas devem ser **protegidas preventivamente até ao início do pintor**, realizando-se os tratamentos de acordo com a persistência de ação dos fungicidas utilizados, tendo o cuidado de **alternar as famílias químicas** dos produtos fitofarmacêuticos e **não ultrapassando o número de aplicações permitidas por ano**.

Nas vinhas em que a doença se tenha já manifestado, deverá ser aplicado **enxofre** ou **metildinocape**, tendo no entanto em atenção a possível fitotoxicidade (queima) provocada por estes produtos quando a temperatura ultrapassa os 32°C. Sempre que haja risco de ocorrência de elevadas temperaturas as aplicações de enxofre deverão ser efetuadas apenas na face das videiras voltada a Norte (sombra).

Não devem ser descuradas as operações culturais, por forma a que as sebes de vegetação permitam o arejamento da zona dos cachos e a boa penetração da calda fungicida.

#### Nota

Para contrariar o desenvolvimento das doenças e aumentar a eficácia dos tratamentos é muito importante que a despampa esteja realizada e que a vegetação seja corretamente orientada. Estas operações culturais promovem o arejamento do interior da sebe e facilitam a penetração da calda fungicida.

### MÍLDIO

A previsão meteorológica aponta para a continuação de instabilidade climática.

Assim, as vinhas que se encontrarem desprotegidas contra o míldio devem ser tratadas. Aconselhamos um **fungicida penetrante**.

À data da realização do tratamento anti-oídio, deverá ser adicionado à calda um fungicida anti-míldio.

### PODRIDÃO NEGRA (Black Rot)

Nas vinhas onde existam manchas da doença, na escolha do fungicida deverá ter o cuidado de selecionar os fungicidas anti-oídio ou anti-míldio que possuam também eficácia contra o Black Rot.

### TRACA DA UVA

Teve já início o voo que irá originar a segunda geração da praga, mas é **ainda cedo** para efetuar qualquer tratamento. Nesta fase, os Srs. Viticultores deverão efetuar a **monitorização da praga** nas várias parcelas de vinha através de armadilhas com atrativos sexuais e deverá efetuar a **Estimativa do Risco**, contando o número de ovos e/ou perfurações existentes em 100 cachos (dois cachos ao acaso em 50 cepas).

Os fungicidas homologados para a cultura da vinha, devem ser consultados no site da DGAV: **SIFITO- Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos** - [Sifito \(dgav.pt\)](https://sifito.dgav.pt).